

DESCRIPCION DE UNA NUEVA ESPECIE DE HELICELLA DE LA
PROVINCIA DE HUELVA, *HELICOPSIS (HELICOPSIS) ALTENAI* n. sp.
(GASTROP. PULMON.)

por Luis Gasull

La especie que se describe tiene una muy limitada área de dispersión, pues por el momento sólo la recolecté en una única localidad de la provincia Palma del Condado 12-3-73, en los taludes cubiertos de vegetación herbácea de la carretera general, junto a la misma población, donde resulta relativamente abundante.

Se trata de una especie con una concha blanquecina, con pequeñas flamulaciones castaño claro, cónico-globulosa, con seis vueltas de espira de crecimiento regular, con una muy débil angulosidad incipiente en el último anfracto, vueltas convexas con sutura profunda; convexa por debajo. Vértice liso algo córneo; ombligo muy pequeño. Abertura redonda, algo oblicua, con el peristoma discontinuo y algo reflejo sobre el ombligo. Escultura en estrias muy finas sólo visibles con aumento, más fuertes en la parte superior.

La concha mayor mide Alt. 6 y Diám. 6 mm., es decir igual alta que ancha.


Esta especie fue hallada por primera vez, dos conchas vacías, en la misma localidad, y descritas sin denominar por Ortiz de Zárate (1961).

Los dibujos de los genitales que se acompañan fueron realizados por el Prof. E. Gittemberger de Leiden, a quien agradecemos su trabajo, manifestando este profesor que las partes blandas de los dos ejemplares examinados resultaron demasiado secas y fueron tratadas con una solución de fosfato trisódico, para obtener la necesaria transparencia y reblandecimiento y por este motivo se publican ambos dibujos, por si hubo alguna pequeña variación de medidas relativas de los diversos órganos.

LUIS GASULL



Aumentado 6 veces Foto Reinald



Helicopsis (Helicopsis) altenai n. sp. de Palma de Condado, Huelva.

Dedico esta especie al Prof. C. O. van Regteren Altena de Leiden, en agradeciimiento de sus consejos y colaboraciones.

El género *Helicopsis* Fitzinger 1833, se caracteriza según los autores, por los siguientes detalles del aparato sexual: Dos sacos del dardo a cada lado de la vagina, los más pequeños interiores adheridos a la misma, los mayores con un dardo corto, liso, redondo y recto. A la base del tallo del receptáculo 4 glándulas de la albúmina bi o trifurcadas, radiales. Pene corto y grueso. Epifalo delgado con un corto flagelo.

Creo que es importante destacar desde el punto de vista zoogeográfico, la presencia de este género en el Sureste Ibérico y es la primera vez que se comprueba su existencia en España.

BIBLIOGRAFIA

- 1961 ORTIZ DE ZARATE, A. y ORTIZ DE ZARATE, A.—Moluscos terrestres recogidos en la provincia de Huelva. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. (B). 59, pp. 169-190.